

# Ethogrammes de quelques espèces de Mammifères observés en captivité en Juillet-Août 2007 par période de 15min (pauses déjeuners)

## Loups blancs d'Artique (*Canis lupus*)

Meute composée d'au moins 8 individus dont 2 juvéniles (1 mâle et 1 femelle) et 1 femelle dominante

- Repos: sur le ventre, sur les flancs, recroquevillé
- Fourrager
- Manger
- Creuser
- Jeu: attraper sa queue, gueule-gueule, morsures
- Marcher, Courir
- Se baigner
- Grooming: se lécher, se frotter contre le substrat, se frotter contre la végétation, se secouer
- Signes d'agressivité: montrer les crocs, morsure du museau, grognements



## Chiens de prairie à queue noire (*Cynomys ludovicianus*)

Population composée d'au moins 15 individus

- Fourrager
- Manger
- Repos
- Sunning
- Alerte
- Maintenance du terrier : creuser, tasser la terre avec le museau
- Marcher, Courir
- Self grooming
- Social grooming
- Nez à nez: permet la reconnaissance entre les individus
- Jeu
- Conflits
- Communication: cris, claquement des dents
- Remuer la queue



## Wallabies de Bennett (*Macropus rufogriseus*)

Population composée d'individus adultes, de juvéniles et d'un mâle adulte juvénile

- Fourrager
- Manger
- Sauter
- Self grooming
- Repos
- Téter



## Tigres de Sibérie (*Panthera tigris altaica*)

Population composée de 4 individus:

1 mâle adulte, 1 femelle adulte et 2 juvéniles

- Repos
- Marcher, Courir
- Jeu
- Manger, Boire
- Conflits
- Jets d'urine, notamment par le mâle adulte: marquage du territoire



## Macaques rhésus (*Macaca mulatta*)

Population composée d'au moins 25 individus, dont 3 juvéniles

- Fourrager
- Manger
- Repos
- Posture stationnaire: assis
- Jeu
- Grimper aux grillages, cordes, échelles
- Conflits
- Coalitions
- Cris
- Expressions faciales : open mouth



Rq: Hiérarchie très marquée, catégorisée notamment par des conflits violents et fréquents

## Macaques crabiers (*Macaca fascicularis*)

Population composée d'au moins 15 individus

- Fourrager
- Manger
- Self grooming
- Posture stationnaire: assis
- Grimper aux grillages, cordes
- Marcher

Rq: Dimorphisme sexuel peu marqué



## Siamang (*Symphalangus syndactylus*)

Population composée de 4 individus

- Fourrager
- Manger
- Marcher
- Posture stationnaire: assis
- Open mouth
- Grimper aux branchages, se balancer

Rq: Bras aussi longs que le corps



## Mandrills (*Mandrillus sphinx*)

Population composée de 4 individus

- Repos
- Marcher
- Self grooming
- Social grooming
- Fourrager
- Manger



### Orang-outan (*Pongo pygmaeus*)

Population composée de 3 individus:

1 mâle adulte, 1 femelle adulte et son juvénile

- Jeu
- Fourrager
- Manger
- Repos
- Self grooming
- Grimper aux pan de bois, cordes, filets



### Petits-pandas (*Ailurus fulgens*)

Population composée de 2 individus adultes

- Repos (plus de  $\frac{3}{4}$  du temps)
- Marcher
- Fourrager
- Manger
- Grimper aux arbres



### Lions de mer de Californie (*Zalophus californianus*), Lions de mer de Patagonie (*Otaria flavescens*)

- Repos
- Nager
- Sauter
- Aboyer
- Self grooming
- Jeu: sauter hors de l'eau
- Nage à 2
- Conflits
- Parades nuptiales



Remarque: Ce rapport ne regroupe que des observations faites par plaisir lors d'un emploi saisonnier.

Remarque: Beaucoup de ces comportements étaient biaisés par le comportement des touristes qui tapaient aux carreaux, aux grillages ou qui envoyaient du pop-corn